



RUJEOLA

- este **foarte contagioasă**
- **se transmite rapid** dacă nu există imunitate colectivă
- poate declanșa **epidemii**

1 DIN 5 CAZURI



poate prezenta boli grave sau **complicații**:
otită, pneumonie, surditate permanentă,
encefalită sau chiar deces.

RUJEOLA SE PREVINE PRIN **VACCINARE**

>20 MILIOANE
decese au fost
prevenite începând
din anul 2000



Vaccinurile pentru prevenirea rujeolei sunt **sigure și eficiente**.

Două doze de vaccin componenta rujeolică oferă aproape **100% protecție** împotriva rujeolei.



Să ne adresăm
**medicului
de familie!**

În epidemia de rujeolă din România, începând din anul 2016 până în data de 22 martie 2019, s-au înregistrat 16211 cazuri confirmate cu rujeolă, din care 62 decese.

VACCINURILE

sunt cea mai bună apărare pe care o avem împotriva bolilor contagioase grave și uneori mortale.



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CNEPSS

CENTRUL NAȚIONAL DE
EVALUARE ȘI PROMOVARE A
STĂRII DE SĂNĂTATE



CENTRUL NAȚIONAL DE
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL
AL BOLILOR TRANSMISIBILE



CENTRUL REGIONAL DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ
TIMIȘOARA



VACCINEAZĂ-ȚI COPILUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI (POJARULUI) PENTRU CEL MAI SIGUR ÎNCEPUT ÎN VIAȚĂ!

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații.

Din 4 persoane care fac rujeolă 1 are nevoie de spitalizare.

Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeolă (pojar), boala este mortală.

Vaccinul împotriva rujeolei (pojarului) protejează copiii împotriva acestei boli.

În România 9 din 10 părinți își vaccinează copiii.

Întreabă acum medicul despre vaccinul împotriva rujeolei (pojarului)!



desprevaccin.ro



**World Health
Organization**

REGIONAL OFFICE FOR
Europe



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

unicef 

RUJEOLA

- este o boală infecțioasă acută
- este cauzată de un virus
- este foarte contagioasă
- poate declanșa epidemii
- este de **6 ORI** mai infecțioasă decât gripa.
- se transmite rapid în comunitate și între comunități, dacă nu există imunitate colectivă.
- este una din cauzele principale de deces la copiii mici, cu toate că sunt disponibile vaccinuri sigure.

Simptomele includ febră, tuse, rinoree, ochi roșii și erupție cutanată.

1 DIN 5 CAZURI



poate prezenta boli grave ori **complicații**: pneumonie, otită, surditate permanentă, encefalită sau chiar deces.

VACCINURILE

- ✓ Sunt **cea mai bună apărare** pe care o avem împotriva bolilor contagioase grave.
- ✓ Mai mult de **100 milioane de copii** sunt vaccinați anual împotriva bolilor, cum sunt: difteria, tetanosul, tusea convulsivă, tuberculoza, poliomielita, rujeola și hepatita B.
- ✓ Vaccinurile rujeolice sunt **sigure** și **eficiente**. Acestea sunt supuse unor testări riguroase și au un istoric foarte bun al siguranței după 50 de ani de când sunt folosite.
- ✓ Două doze de vaccin componenta rujeolică oferă aproape **100% protecție** împotriva rujeolei.
- ✓ În perioada 2000-2016, vaccinarea a dus la o **scădere cu 84% a deceselor** prin rujeolă și a prevenit 20,4 milioane decese, ceea ce face din vaccinul rujeolic unul din cele mai bune ajutoare pentru sănătatea publică.

RUJEOLA la nivel european, conform OMS Europa:

Rujeola a ucis 72 copii și adulți în Regiunea europeană în anul 2018.

Conform rapoartelor naționale lunare din perioada ianuarie - decembrie 2018 (primită la 1 februarie 2019), 82596 persoane în 47 din cele 53 țări au contractat rujeola.

În țările care au raportat date de spitalizare, aproape 2/3 (61%) din cazurile de rujeolă au fost spitalizate.

Numărul total de persoane infectate în 2018 a fost de 3 ori mai mare decât totalul raportat în 2017 și de 15 ori mai mare decât totalul raportat în 2016.

RUJEOLA la nivel național, conform CNSCBT:

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România, raportate de la începutul epidemiei din anul 2016 până la data de 22.03.2019 este 16211, din care 62 de decese.

În vederea limitării extinderii epidemiei de rujeolă din România, au fost organizate campanii suplimentare de vaccinare cu RRO a copiilor. INSP-CNSCBT monitorizează această activitate, iar realizările sunt centralizate la nivel național și sunt publicate periodic.

VACCINAREA OFERĂ COPILULUI TĂU CEL MAI SIGUR ÎNCEPUT ÎN VIAȚĂ

Vaccinurilor li se datorează unele dintre cele mai mari povești de succes din domeniul sănătății publice din zilele noastre. În 1980, înainte ca vaccinarea antirujeolică să fie aplicată la scară largă, rujeola a cauzat aproximativ 2,6 milioane de decese în întreaga lume. În 2012 acest număr a fost micșorat de peste 20 de ori, datorită vaccinării.

Vaccinarea este una dintre cele mai sigure intervenții medicale. În unele cazuri pot apărea reacții adverse ușoare cum ar fi febra sau înroșirea și umflarea ușoară a locului unde s-a făcut vaccinul. Acestea sunt doar mici inconveniente în comparație cu riscurile și complicațiile asociate bolii.

**Protejează-ți copilul pentru toată viața!
Întreabă acum medicul despre vaccinul
împotriva rujeolei (pojarului)!**

OMS/M. BRING

 desprevaccin.ro



**VACCINEAZĂ-ȚI COPILUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI (POJARULUI)
PENTRU CEL MAI SIGUR ÎNCEPUT ÎN VIAȚĂ!**

 desprevaccin.ro

 World Health
Organization
REGIONAL OFFICE FOR Europe

 GUVERNUL
ROMÂNIEI
MINISTERUL SĂNĂȚĂII

 unicef

RUJEOLA (POJARUL) ESTE O BOALĂ GRAVĂ

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă foarte contagioasă. Simptomele apar de obicei la 10-12 zile de la contactul cu virusul și la început pot fi confundate cu o răceală obișnuită: secreții nazale, tuse și febră mică. Pe măsură ce boala progesează și în special între a treia și a șaptea zi de la debut, temperatura crește până la 39-41°C iar pe corp apare o erupție caracteristică reprezentată de pete roșii care persistă de la 4 la 7 zile.

Rujeola duce deseori la complicații care pot afecta aproape orice organ, cum ar fi encefalita, pneumonia sau infecții ale urechii. Pot apărea diareea severă și deshidratarea secundară, iar orbirea poate fi una dintre sechelele rujeolei.

30% dintre cazurile de rujeolă dezvoltă complicații

1 din 4 persoane care fac pojar are nevoie de internare în spital

1 din 1000 bolnavi de pojar moare din cauza bolii!

VACCINAREA ÎȚI POATE PROTEJA COPILUL PENTRU TOATĂ VIAȚA

Doar vaccinarea îți protejează copilul împotriva rujeolei (pojarului) și a complicațiilor sale. Pojarul este o boală gravă. O dată ce boala s-a declanșat pot fi tratate numai simptomele acesteia.

Vaccinul te protejează și elimină riscul de a face forme severe ale bolii, complicații sau deces care pot apărea atunci când ești infectat.

2 doze de vaccin rujeolic te protejează aproape 100% împotriva bolii și complicațiilor potențial severe ale acesteia sau care pot duce la deces.

Vaccinul ROR protejează copilul tău de trei boli: rujeolă, oreion și rubeolă. Copilul tău trebuie să primească **prima doză de vaccin ROR atunci când împlinește 1 an, iar pe cea de-a doua la vârsta de 5 ani.**

În România **9 din 10** părinți își vaccinează copiii

